

### 1.Damlacık önlemleri uygulanması gereken enfeksiyonlar

- İnvaziv H. influenzae tip B enfeksiyonu, (menenjit, pnömoni, epiglottit ve sepsis)
- İnvaziv Neisseria meningitidis enfeksiyonu, (menenjit, pnömoni ve sepsis)
- Difteri
- Mycoplasma pneumonia
- Boğmaca
- Pnömonik veba
- Çocuklarda streptokokal (grup A) farenjit, pnömoni ve kızıl
- Adenovirus
- İnfluenzae
- Kabakulak
- Parvovirüs B19
- Kızamıkçık

### 2.Damlacık Önlemleri

- 2.1.Damlacık önlemleri 5 mikrometreden büyük partiküller yoluyla bulaşan enfeksiyonların riskini azaltmaya yöneliktir. Bu büyüklükteki partiküller havada asılı kalmaz ve uzak mesafelere gidemez.
- 2.2.Hasta tek kişilik odaya alınmalıdır.
- 2.3.Eğer tek kişilik odada izlemek mümkün değilse, aynı mikroorganizma ile enfekte ve başka enfeksiyonu olmayan bir hasta ile aynı odada yatırılmalıdır.
- 2.4.Eğer farklı tanıli hastalarla aynı odayı paylaşması gerekiyorsa yataklar arası mesafe en az 1 m olmalıdır.
- 2.5.Oda kapısı açık olabilir
- 2.6.Sağlık personeli hastaya 1 metreden yakın mesafede çalışırken maske takmalıdır
- 2.7.Hasta çok gerekmedikçe oda dışına çıkmamalıdır. Oda dışına çıkacaksa cerrahi maske ile çıkarılmalıdır
- 2.8.Tansiyon aleti, steteskop vs. hastaya özel olmalı ve hasta odasında tıbbi atık torbası ve eldiven bulundurulmalıdır.

**3. Uyarılar: Duyarlı kişiye burun-ağız-konjonktiva yoluyla bulaşma olacağından;** Enfekte hastaların konuşması, öksürmesi ya da burun silmesi, aspirasyon, entübasyon, bronkoskopi gibi işlemler sırasında bulaş olasılığının arttığı bilinmelidir.

Hazırlayan	Kontrol Eden	Onaylayan

